

تاریخ: جنوری 2026, 16

نمبر: 3529-26\PPA

### بیکٹیریل اینٹی مائیکروبیل مزاحمت کے عوامل: ارتقائی میکنازم، عالمی پھیلاؤ، اور کنٹرول کی حکمت عملیاں۔

اینٹی مائیکروبیل مزاحمت ایک عالمی ارتقائی اور ماحولیاتی چیلنج کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جو بیکٹیریا کی جینیاتی پک اور ماحولیاتی انتخابی دباؤ کے نتیجے میں ابھرتی ہے، جس میں بیکٹیریا مسلسل نئے مزاحمتی کلونز پیدا کرتے ہیں۔ اسپونہ پینٹس، موٹیشنز، ہوریزونٹل جین ٹرانسفر، اور پلسمیڈز، ٹرانسپوزوز، اور انٹیگرز کے ذریعے مزاحمتی جینز کی منتقلی بیکٹیریا کو مختلف ماحولیاتی نیشز میں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ 48.mecA (کار باسینیمین)، blaNDM، blaKPC، blaOXA، جیسے ہسپتال کے آئی سی یوز، زرعی پانی کے ذخائر، اور ویسٹ واٹر سسٹمز۔ کلینیکل لحاظ سے میں کو لیسٹین (E. coli) mcr-1 اور، (میں ویکٹوماکس مزاحمت Enterococcus faecium) vanA، (میں میتھیسیلین مزاحمت Staphylococcus aureus) پیدا کرنے والے MRSA، VRE، ESBL جیسے جینز واضح مثالیں ہیں کہ کس طرح مولیکولر ارتقاء علاج میں ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ عالمی سطح پر (مزاحمت کی ظہور اس بات کا ثبوت ہے کہ بیکٹیریل ارتقاء اکثر اینٹی بائیوٹک دریافت سے تیز ہوتا ہے۔ Acinetobacter baumannii اور کار باسینیم ریزسٹنٹ، Enterobacteriaceae، بیکٹیریا اینٹی مائیکروبیل ایجنٹس کے خلاف دفاعی میکنازم کو ایک پیچیدہ، کثیر الجہتی نظام کے ذریعے عمل میں لاتے ہیں جو جینیاتی، بائیو کیمیکل اور سٹرکچرل سطح پر انٹریکٹ کرتا ہے، جس میں اینزائمیٹک پیسنسز اور سیفیلو سپورز کے حلقے کو ہائیڈرولائز کر کے، ESBLs، NDM-1، VIM، KPC، لیکنا میز، جیسے - انحطاط، ٹارگٹ کی تبدیلی، انٹلکس پمپس، اور بائیو فلم کی تشکیل شامل ہیں۔ مزاحمت پیدا کرتی ہیں۔ ایپیمینو گلیکوسائیڈ۔ موڈیفائنگ اینزائمز، جیسے ایسٹیل ٹرانسفریز، فاسفور ٹرانسفریز، اور نیوکلئوٹائیل ٹرانسفریز، ادویات کو غیر فعال کر کے رائبوسوم کی وابستگی کو کم کرتے ہیں۔ جینز کے erm کو تبدیل کر کے فلور کوئیونولوز میں اعلیٰ سطح کی مزاحمت پیدا کرتے ہیں، جبکہ DNA gyrase اور topoisomerase IV جینز میں موٹیشنز parC اور gyrA پری کر سرز میں تبدیلی کر کے ویکٹوماکس peptidoglycan جینز vanA اور vanB کی میتھیسیلین رائبوسومز کو میکرو لائیڈز کے لیے غیر حساس بناتی ہے۔ S rRNA ذریعے 23 بانڈنگ سائٹس کو تبدیل کرتے ہیں، جس سے گلو کوپٹائڈ مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔

مختلف (S. aureus) NorA اور (Pseudomonas aeruginosa) MexAB-OprM، (E. coli) AcrAB-TolC، انٹلکس پمپ سسٹمز، جیسے لیکنا مز اور کوئیونولوز۔ اینٹی بائیوٹکس کے داخلے کو محدود کرتی ہے، خاص طور پر (OprD اور OprF مثال کے طور پر) اینٹی بائیوٹکس کو غلیے سے خارج کرتے ہیں، جبکہ پورنز کی کمی یا تبدیلی (کیٹیٹر کی سطح پر)، Staphylococcus epidermidis (سیسٹک فائبروسس کے پھیپھڑوں میں) اور Pseudomonas aeruginosa میں۔ بائیو فلم کی تشکیل، جیسے 1000 گنا زیادہ مزاحمت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ ایکسٹریسلولر پولیمرک بیریزز، مینابولک ڈورمنسی اور کورم سینسنگ کا ہم آہنگ عمل ہے۔ بائیو فلم سے منسلک "پرسیسٹرز" اینٹی بائیوٹک تھراپی اور ایمنو کلیرنس سے بچ جاتے ہیں، اور دیر پا انفیکشن کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔

1-blaTEM-blaCTX-M-mcr-1 ہوریزونٹل چین ٹرانسفر بیکٹیریل مزاحمت کے پھیلاؤ کو انواع اور ماحولیاتی رکاوٹوں کے پار تیز کرتا ہے۔ کنجوگیشن کے ذریعے پلیسمڈ جینز، جیسے *Neisseria gonorrhoeae*، *Streptococcus pneumoniae*، *Acinetobacter baylyi* کے نکلوں کو جذب کر کے اپنے کروموسوم میں مزاحمتی جینز شامل کرتے ہیں۔ بیکٹیریل فیکٹریز ٹرانسڈکشن کے ذریعے جینز منتقل کرتے ہیں، جو موزیک جینوم ڈھانچے کی DNA آزاد (baylyi) تشکیل میں معاون ہوتا ہے، جبکہ کلاس 1 اینٹیگروں متعدد ریزسٹنس کیسیٹس کو یکجا کر کے دباؤ میں ان کی کو-ایکسپریشن کو یقینی بناتے ہیں۔

Whole Genome Sequencing (WGS) جدید جینومک نگرانی بیکٹیریل ارتقاء، ہیئتو جن پھیلاؤ، اور عالمی وبائیات کی سمجھ کے لیے اعلیٰ ریزولوشن بصیرت فراہم کرتی ہے۔ *E. coli* ST131 اور *Klebsiella pneumoniae* ST258 (blaKPC) کروموسوم اور پلیسمڈ-اینکلوڈ ریزسٹنس جینز کی مکمل نقشہ بندی کرتی ہے، جیسے (15) کے عالمی پھیلاؤ کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ تقابلی جینومکس اور پین جینومک تجزیہ بنیادی اور اضافی جینز کی شناخت، کلونل پھیلاؤ اور آزاد ظہور کو ممتاز کرتے ہیں۔ مینا جینومک-blaCTX-M (CARD، تجزیہ وبائی ٹریکنگ کے لیے اعلیٰ ریزولوشن فراہم کرتا ہے۔ پلیسمڈوم پروفاٹنگ اور بائیوفارمیٹکس ڈیٹا بیسز SNP تجزیہ ماحول میں ریزسٹنس جینز کی شناخت میں مدد دیتا ہے، جبکہ مزاحمتی فینونائپس کی پیشگوئی کرنے اور عمومی صحت کے اقدامات کے لیے بنیادی ہیں۔ (ResFinder، NCBI Pathogen Detection)

PFGE اور مولیکولر ٹائپنگ اور ڈیجیٹل ایپیڈمیولوجی ہسپتالوں میں آؤٹ بریک کی شناخت، بین الاقوامی پھیلاؤ کی نگرانی، اور اینٹی مائیکروبیئل کنٹرول کے لیے موثر حکمت عملی فراہم کرتی ہیں۔ Rep-PCR، AFLP، RAPD ٹائپنگ سب کلونل سطح پر درستی فراہم کرتے ہیں۔ SNP اور cgMLST کلونل پھیلاؤ کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ MLST قریبی کلونز کی تمیز کرتے ہیں، اور مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ابھرتے ہوئے ریزسٹنس ہاٹ اسپاٹس کی پیشگوئی اور اینٹی مائیکروبیئل اسٹوارڈشپ کو بہتر بناتے ہیں۔

فوری اور حساس (SHERLOCK، DETECTR) ڈائیگنوسٹکس CRISPR جینومکس اور پریسیژن تھراپی کے امتزاج نے بیکٹیریل یاولوجی کو پیشگوئی کرنے والا شعبہ بنایا ہے۔ جینومک اینالیٹکس خام سیکیوینسنگ ڈیٹا کو کلینیکل AI-driven سیکیوینسنگ فیلڈ میں آؤٹ بریک ٹریکنگ اور ہسپتال سطح پر نگرانی ممکن بناتی ہے۔ Nanopore شناخت فراہم کرتے ہیں، جبکہ بصیرت میں تبدیل کرتی ہے، اینٹی بائیونک حساسیت کی پیشگوئی، نئے ریزسٹنس جینز کی شناخت، اور تجرباتی تھراپی کی بہتری ممکن بناتی ہے۔ یہ امتزاج پریسیژن بیکٹیریل یاولوجی کی بنیاد رکھتا ہے، جو ارتقائی رجحانات کی پیشگوئی، عالمی پالیسی سازی، اور اینٹی بائیونک افادیت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔

بیکٹیریل مزاحمت کے بڑھتے ہوئے بحران کے پیش نظر روایتی مائیکروبیولوجی سے جدید، جامع اور ڈیٹا پر مبنی مولیکولر نگرانی کی ضرورت ہے۔ جینوم سیکیوینسنگ، بائیوفارمیٹکس، اور ارتقائی تجزیات بیکٹیریل یاولوجی کو ایک پیشگوئی کرنے والا اور کنٹرول کرنے والا شعبہ بناتے ہیں۔ کلینیکل مائیکروبیولوجی اور عالمی جینومک انٹیمی جنس کا امتزاج بیکٹیریل ارتقاء کو صرف مشاہدہ نہیں بلکہ پیشگوئی انداز میں محدود، قابو اور کنٹرول کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو عالمی سطح پر اینٹی مائیکروبیئل پالیسی اور پریسیژن میڈیسن کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔

## REFERENCES:

- [1] World Health Organization. *Global action plan on antimicrobial resistance*. Geneva: WHO; 2015. Available from: <https://www.who.int>
- [2] Centers for Disease Control and Prevention. *Antibiotic resistance threats in the United States*. Atlanta: CDC; 2019. Available from: <https://www.cdc.gov>
- [3] Davies J, Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance. *Microbiol Mol Biol Rev*. 2010;74(3):417–433. Available from: <https://journals.asm.org>
- [4] Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. *P T*. 2015;40(4):277–283. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- [5] Munita JM, Arias CA. Mechanisms of antibiotic resistance. *Microbiol Spectr*. 2016;4(2):1–24. Available from: <https://journals.asm.org>
- [6] Holmes AH, Moore LSP, Sundsfjord A, Steinbakk M, Regmi S, Karkey A, et al. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance. *Lancet*. 2016;387(10014):176–187. Available from: <https://www.thelancet.com>

- [7] Blair JMA, Webber MA, Baylay AJ, Ogbolu DO, Piddock LJV. Molecular mechanisms of antibiotic resistance. *Nat Rev Microbiol*. 2015;13(1):42–51. Available from: <https://www.nature.com>
- [8] Laxminarayan R, Sridhar D, Blaser M, Wang M, Woolhouse M. Achieving global targets for antimicrobial resistance. *Science*. 2016;353(6302):874–875. Available from: <https://www.science.org>
- [9] Prestinaci F, Pezzotti P, Pantosti A. Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. *Pathog Glob Health*. 2015;109(7):309–318. Available from: <https://www.tandfonline.com>
- [10] O'Neill J. *Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations*. London: Review on Antimicrobial Resistance; 2016. Available from: <https://amr-review.org>

ڈاکٹر طہ نذیر Ph.D

مَدِيرِ اَعْلٰی: رسالہ الدویہ PHARMACEUTICAL REVIEW

ISSN 2220-5167;W: <https://pharmaceuticalsreview.com/>